

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 11.02.2013 / 9066

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 g/100 L su	14 gün
	Külleme (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Hıyar ve Kavun (*)	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	40 g/100 L su	3 gün
Şeker Pancarı	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	40 g/100 L su	21 gün
Şeftali	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Kiraz ve Vişne	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Yeni Dünya	Karaleke (<i>Venturia inaequalis var eriobotryae</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Ayva	Monilya (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	60 g/100 L su	14 gün
Bağ**	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	100 g/100 L su	14 gün

* Ege ve Akdeniz bölgesinde tavsiye edilmemelidir.

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünüün aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

19 Temmuz 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL ETANOP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	B1:1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

%70 Thiophanate-Methyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Baş dönmesi, mide bulantısı, bulanık görme, deri iltihabı, burun iltihabı, halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Solunması Halinde kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması Halinde bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Cilt Teması Halinde Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz Teması Halinde Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım
Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



Net Miktarı (kg veya L)
Azami Perekende Satış Fiyatı
İçindekiler: Thiophanate-Methyl



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır
H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ:

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308 +P313 Maruz kalınma veya etkilene halde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P363 Kirli giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bitki koruma ürünüün ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız

Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Anılar için zehirlidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KİSİN

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Elmada Karalekesi :

1. Uygulama : çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama : pembe rozet tomurcuğu döneminde(çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama : Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulama : iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma Küllemesi :

- 1.Uygulama:Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
- 2.Uygulama:Çiçek taç yapraklarının %60-70 'i döküldüğünde
3. ve diğer uygulamalar:Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armut Karalekesi :

1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
- 3 Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulama : kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kabakgillerde Külleme (Hıyar ,Kavun):

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C' nin üstünde ve orantılı nemin %50 'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Şeker pancarı yaprak leke hastalığı:

Şeker pancarı erişkin yapraklarının %5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır.15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne)

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. Uygulama: Tam çiçeklenme (%90-100 çiçekte) yapılır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL ETANOP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	B1:1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

Aktif madde miktarı : %70 Thiophanate-Methyl

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firmamız iacının kalitesini garanti eder. Firmamız ilaçların hatalı depolama veya hatalı kullanımından meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir

ÜRETİM YERİ

Jiangsu Lanfeng Biochemical Co., Ltd.
Suhua Road,Xinyi Economic&Technological Development
Zone,Xinyi,Jiangsu,China

İMALATÇI FİRMA

Shanghai Safe Chem International Trade Co., Ltd.
Address: 10F, No.818 DongFang
Road, Shanghai China.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım
Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



19 Temmuz 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN

Yeni Dünya Karalekesi :

1. Uygulama : Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce.
2. Uygulama : Çiçek tomurcukları açılmadan önce
3. Uygulama : Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden önce
4. ve diğer uygulama : 3.uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar ,kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva Monilyası:

1. Uygulama: Çiçeklerin %5 i açtığında
2. Uygulama: Çiçeklerin %50 si açtığında
- 3 Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (Çiçeklerin (%90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama : Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2. Uygulama : Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
3. Uygulama : Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4. ve diğer uygulamalar : 3.uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL ETANOP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu B1:1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ETANOP' u aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B1:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir. EFDAL ETANOP, mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungusittir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL ETANOP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	B1:1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

Aktif madde miktarı : %70 Thiophanate-Methyl

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım
Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



ÜRETİM YERİ

Jiangsu Lanfeng Biochemical Co., Ltd.
Suhua Road,Xinyi Economic&Technological Development
Zone,Xinyi,Jiangsu,China

İMALATÇI FİRMA

Shanghai Safe Chem International Trade Co., Ltd.
Address: 10F, No.818 DongFang
Road, Shanghai China.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

19 Temmuz 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KIŞIN