

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: 04.11.2011 / 8448

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu ve dönemi
Domates (Sera)	Kök-ur nematodları (Meloiodogyne spp.)	10 kg/ da Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce
Bağ*	Bağda Haziran Böceği (Polyphylla fullo)	7.5 gr/ omca Dikim sırasında veya kurulu bağlarda ilkbaharda zarar başlamadan önce

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alanlara verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste (Sera): İyi bir toprak işleminin ardından, verilen dozda, fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce granül aplikatörü, gübre makinesi ya da lastik eldiven giyilerek el ile homojen veya yeterince su verilerek bitki koruma ürününün 15-20 cm derine karışması sağlanmalıdır. İlaç 5-6 saat içerisinde toprağa bağlandıktan sonra uygulama ile toprağa karıştırma aynı gün içinde olmalıdır.

EFDAL NOKAB 10G, uygulandığı yerde toprak altı zararlılarını da kontrol ettiğinden ayrıca bir mücadeleye gerek kalmaz.

Bağda: Yeni bağ kurarken fidan çukuruna doldurulacak toprak veya harca **EFDAL NOKAB 10G** verilen dozda karıştırılmalıdır. Kurulu bağlarda omca çevresine homojen olarak serilmeli, çapalanmalı ve bekmeden larvaların faaliyet gösterdikleri derinliğe kadar ısıtma sağlayacak şekilde su verilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **EFDAL NOKAB 10 G** isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisit- insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL NOKAB 10 G** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Toprak uygulaması şeklinde kullandığından, diğer bitki koruma ürünleri ile karışması söz konusu değildir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL NOKAB 10 G

Granül (GR)

GRUBU	1B	NEMATİSİT-İNSEKTİSİT (Nematod ve Böcek ilacı)
-------	----	---

%10 Ethoprophos

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme, salya, kusma, morarma, gözbebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seyirme, kasılma ve refleks bozukluğu.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: ATROPİN SULFAT ve TOXOGONİN'dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



14 Temmuz 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Ethoprophos

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H310:** Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H330:** Solunması halinde öldürücüdür.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P201:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P260:** Toz/ is/ gaz/ duman/ buhar/ spreyini solumayınız.
- P264:** Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız.
- P273:** Çevreye yayılmasını önleyiniz. P280 Koruma eldiveni/ koruyucu giysi kullanınız.
- P284:** Solunum koruması takınız. P301 + P310 YUTULMASI HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.
- P330:** Ağızınızı çalkalayın.
- P501:** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf ediniz.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA: JIANGSU FENGSHAN GROUP CO., LTD.

Wanggang Town, Dafeng District, Yancheng City, Jiangsu Province, Çin

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Çağrı Merkez:4443150
Faks: 0 236 237 96 45 - www.tarkimkb.com.tr

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.