



tarkim
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.

Efdal Brokles Of

Şeker Pancarı

Aktif Madde ve Miktarı Ethofumesate 112 g/L + Phenmediphame 91 g/L + Desmediphame 71 g/L
Grubu N,8; C1,5; C1,5

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Emülsiyon Konsantre (EC)

**Şeker Pancarında
Geniş Yapraklı Yabancı Otlara
Güvenilir Etki**



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketidir.



444 31 50
Çağrı Merkezi
www.tarkimbk.com.tr

Efdal Brokles Of

Şeker Pancarı

Efdal Brokles Of

Şeker pancarında sorun olan tek yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılan seçici ve sistemik bir ot ilacıdır.

Aktif Madde ve Miktarı	Ethofumesate 112 g/L + Phenmediphame 91 g/L + Desmediphame 71 g/L
Grubu	N,8; C1,5; C1,5

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Emülsiyon Konsantré (EC)

ETKİ ŞEKLİ

Phenmedipham ve Desmedipham;

- Çıkış sonrası uygulanabilen seçici sistemik etkili herbisittir.
- Esas itibariyle yapraklardan alınır ve hücreler arası boşluklar yoluyla taşınırlar.
- Bu iki aktif madde hücrede fotosentetik elektron transferini inhibe ederek etkili olur.

Ethofumesate;

- Seçici sistemik etkiye sahip olan Ethofumesate sürgün ve kökler tarafından alınarak yapraklara doğru taşınmaktadır.
- Bitkide kutikula tam olarak oluştuktan sonra yapraklar tarafından alınamamaktadır.
- Lipid sentezini inhibe eder. Meristem gelişimini engeller, hücresel bölünmeyi geciktirir, mumsu tabaka oluşumunu kısıtlar.

ÖZELLİKLERİ

- Brokles Of** yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.
- İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. Uygulamadan önce ilaçlama makinesinin kalibrasyonunu yapınız.
- Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir.
- Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır.
- Yelpaze hüzmeli meme ile uygulanmalıdır.
- Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır.
- İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.



Kırmızı köklü tilki kuyruğu (*Amaranthus retroflexus*)



Sirken (*Chenopodium album*)



Hardal (*Sinapis arvensis*)

KOTİLEDON DÖNEMİ



Yabani Hardal



Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

2-6 YAPRAK DÖNEMİ



Yabani Hardal



Sirken



ŞEKER PANCARI DÖNEMİ

Kotiledon-2 gerçek yaprak dönemi arasında iken, teklemeye önceki dönem

4-6 gerçek yapraklı dönemde iken

YABANCI OT DÖNEMİ

Erken çimlenen yabancı otlara karşı, kotiledon-2 gerçek yapraklı dönemde iken

2-6 yapraklı genç dönemlerinde iken



Efdal Brokles Of

KULLANIM DÖNEMİ

Kotiledon Dönemi
75 ml/da

4-6 Yaprak Dönemi
250 ml/da



Şekerpancari kotiledon-2 yaprak döneminde iken ilaca karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml'den fazla kullanmayınız ve **KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ**.

İDEAL İLAÇLAMA ZAMANI

- İlaçlama bitki üzerinde çiğ ve su damlacıklarının bulunmadığı dönemde, tercihen günün serin ve rüzgarsız saatlerinde yapılmalıdır.
- İlaçlama sırasında hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ve 5°C'nin altında olmamalıdır.

ideal ilaçlama zamanı



Sabah

Öğle

Akşam

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

BİTKİ	YABANCI OTLAR	DOZ/DA
Şeker Pancarı	Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	75 ml/da
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	Şeker pancarı ve yabancı otlar kotiledon-2 gerçek yaprak döneminde iken uygulanır.
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	
	Bambul otu (<i>Heliotropium europeum</i>)	250 ml/da
	Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)	Şeker pancarı 4-6 gerçek yapraklı dönem, yabancı otlar 2-6 genç yapraklı dönemde iken uygulanır.
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
	Fare kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)	
	Tatula (<i>Datura stramonium</i>)	
	Yabani bamya (<i>Hibiscus trionum</i>)	
	Süprüge otu (<i>Descurainia sophia</i>)	
	Çoban çantası (<i>Capsella bursa pastoris</i>)	
	Soda otu (<i>Salsola kali</i>)	
	Taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>)	350 ml/da
	Yapışkan otu (<i>Galium tricorne, G. aparine</i>)	
	Bülbül otu (<i>Sysimbrium officinale</i>)	
	Sığır dili (<i>Anchusa azura</i>)	
	Pire otu (<i>Erigeron canadensis</i>)	
Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)		
Şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)		
Kanarya otu (<i>Senecio vulgaris</i>)		

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diclofob-methyl ve Deltamethrin terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

