



tarkim
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.



Efdal

50 EC

Azphos

Pamuk • Domates • Boş Ambar Uygulaması

Aktif Madde ve Miktarı **Pirimiphos-methyl 500 g/l**
Grubu **1B**

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Kontak ve Mide zehiri, Fumigant etkili

**Üç Etkili
Üstün
KORUMA**



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirkettir.



444 31 50
Çağrı Merkezi

www.tarkimbk.com.tr

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- Azphos**'nin aktif madesi Pirimiphos-methyl'dir.
- "Pirimiphos-methyl", Cholinesterase enzimini engeller.
- Azphos**'nin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır.



Beyazsineği (*Bemisia tabaci*)

ÖZELLİKLERİ

- Azphos**, Pamukta Beyazsineğe karşı, Domateste Yaprakbitlerine karşı kullanılmaktadır.
- Azphos** Boş ambarların dezenfeksiyonunda da kullanılır.



Yaprakbitleri (*Aphis spp*)

KULLANIM ARALIĞI

- Tarlada yapılacak olan ilaçlamalar zararlının durumuna göre 7-14 günde bir tekrarlanmalıdır.
- Sırt atomizörleri, sırt tulumları, traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilebilir. Atomizörle yapılacak ilaçlamalarda aletin ilaç deposunun kapasitesi dikkate alınarak, normale göre 4 misli daha fazla ilaç konulmalıdır.



Pirinçbiti (*Sitophilus oryzae*)

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

Domates Yaprakbitleri, tarlaya köşegenler yönünden girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50, patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek, uygulamaya karar vermeden önce faydalıların etkinliği gözlenmelidir.

Pamukta Beyazsinek yoğunluğunun dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Boş ambar uygulamasında, depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.



Baklagil Tohum böcekleri (*Bruchus spp.*)

KULLANILACAĞI BİTKİ ve ZARARLILAR

| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre |
|----------------------|--|-----------------------------|--|
| BOŞ AMBAR UYGULAMASI | Arpa Güvesi (<i>Sitotraga cerealella</i>) | 300 ml/100 m ² | — |
| | Baklagil Tohum böcekleri (<i>Bruchus spp.</i>) | | — |
| | Buğdaybiti (<i>Sitophilus grananus</i>) | | — |
| | Kırmabiti (<i>Tribolium confusum</i>) | | — |
| | Kuru Meyve Güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) | | — |
| | Patates Güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>) | | — |
| | Pirinçbiti (<i>Sitophilus oryzae</i>) | | — |
| DOMATES | Yaprakbitleri (<i>Aphis spp.</i>) | 100 ml/100 L su Nimf, Ergin | 4 Gün |
| PAMUK | Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) | 200 ml/da Larva, Ergin | 4 Gün |

KARIŞILIRLIK DURUMU

Azphos diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım yapılması tavsiye edilir.