

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarihi ve Numarası: 20.09.2021/12058

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g / 100 l su	7 gün
Domates	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g / 100 l su	7 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g / 100 l su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g / 100 l su	7 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyve ağaçlarında çiçek monilyası ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	40 g / 100 l su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g / 100 l su	7 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g / 100 l su	7 gün

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

EFDAL SAVAGE sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungusittir. Bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan "Cyprodinil" methionin biyosentezini engeller; Cyprodinil yapraklar ve meyveden süratle bünyeye alınır, bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzünden diğer yüzüne iyi bir şekilde taşınır. Diğer etkili madde "Fludioxonil" kontak etkili olup, esas itibarıyla konidilerin çimlenmesini ve fungus miselinin penetrasyonunu engeller.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

20 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL SAVAGE

Suda Dağılılabılır Granül (WG)

Grubu	D1:9	C2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Soluması halinde:** Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.  
**Yutulması halinde:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınır.  
**Cilt ile teması halinde:** Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.  
**Göz ile teması halinde:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Dr. Nesrin ÇAYIRARICAN  
Dalre Başkanı



Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:**

Cyprodinil, Fludioxonil

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
- +35°C'nin üzerinde ve 5°C'nin altında depolamayınız. İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU  
Yüksek Kıyafet  
TARIM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ-Kurşuni küf:

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında, 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;

1. uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce, 2. uygulama: Kapalı salkım döneminde, 3. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

**Domates-Kurşuni küf:** Uygulamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme evresinde iken başlanmalı, 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

**Biber (Sera)- Kurşuni küf:** Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır, hastalığın seyrine göre 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Hıyar (Sera)- Kurşuni küf:** Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgarsız olduğu zamanlarda 10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

**Kiraz- Monilya:** 1. uygulama çiçeklenme başlangıcında %5-10 çiçekte, 2. uygulama tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Çilek- Kurşuni küf:** 1. uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açtığı dönemde, 2. uygulama: Çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde, 3. uygulama: İlk yeşil meyvenin görüldüğü dönemde, 4. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son uygulama ile her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.

**Patlıcan (Sera)- Kurşuni küf:** Uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Bitki tahammülü:** Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** Efdal Savage isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup D1:9 ve E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Efdal Savage aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız, uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (D1:9 ve E2:12 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz,

**KARIŞILIRLIK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışım gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

# tarkim EFDAL SAVAGE

Suda Dağılılabir Granül (WG)

Grubu	D1:9	E2:12	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA  
Tel: 0 236 2340909 pbx.  
Çağrı Merkezi: 4443150  
Faks: 0 236 2379645  
www.tarkimbk.com.tr

Sede  
Yüksek Kimyager  
YÜCEL TEKOĞLU  
TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
T.C. İÇİŞLERİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

20 Eylül 2021