

Efdal • 240 SC
Oksimet

PAMUK, BAĞ, ELMA, DOMATES (Sera), BİBER (Sera)

Aktif Madde ve Miktarı **Methoxyfenozide 240 g/L**
Grubu **18**

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Mide zehirli etkili

UZUN SÜRELİ ETKİLİ
ÇEVREYE GÜVENLİ



ETKİ ŞEKLİ

- “Methoxyfenozide” Kitin sentezini hızlandıran bir aktif maddedir.
- “Methoxyfenozide” Mide yolu ile haşerelere etki eder.

ÖZELLİKLERİ

- **Oksimet** kelebek larvalarına karşı geniş spektrumlu bir ilaçtır.
- **Oksimet** formülasyonlu olup solvent içermez.
- **Oksimet** kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.
- **Oksimet** polen taşıyıcılarına, predatör ve parazitoidlere karşı zararlı değildir.
- **Oksimet** suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- **Oksimet** ile iyi bir netice almak için ilacın tavsiye edilen dozda kullanılması şarttır.
- **Oksimet** 'i kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- **Oksimet** pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

Oksimet aktif maddesi “Methoxyfenozide” ihracat ürünleri için **GÜVENLİDİR**.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır.

Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANIM ARALIĞI

- **Oksimet** geniş kullanım aralığına sahiptir.
- **Oksimet** Yumurta döneminden Larvanın 4-5 mm (L2) dönemine kadar uygulanabilir.



Elma içkurdusu (*Cydia pomonella*)



Salkım Güvesi (*Lobesia botrana*)



Pamuk Yaprakkurdu (*Spodoptera littoralis*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
BAĞ*	Bağ Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	40 ml/100 L su Yumurta, Larva	7 Gün
BİBER (SERA)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da Larva	1 Gün
DOMATES (SERA)	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	50 ml/da Larva	1 Gün
ELMA	Elma içkurdusu (<i>Cydia pomonella</i>)	60 ml/100L su Larva	14 Gün
PAMUK	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	37,5ml/da 2. ve 3. dönem Larva	21 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kükürt ve kuvvetli alkali bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.