

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve no. su: 11.03.2019 / 11333

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	100 ml/100 L su	3 gün
Bağ*	Bağ mildiyösü ( <i>Plasmopara viticola</i> )	80 ml/100 L su	21 gün
	Bağ küllemesi ( <i>Erysiphe necator</i> )	80 ml/100 L su	
	Bağda ölükol ( <i>Phomopsis viticola</i> )	80 ml/100 L su	
Antepfıstığı	Antepfıstığında Karazenk ( <i>Pseudocercospora pistacina</i> )	100 ml/100 L su	21 gün
Nar	Kahverengi leke ( <i>Alternaria alternata</i> )	80 ml/ 100 L su	21 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaeroteca fluginea</i> )	80 ml/ 100 L su	3 gün
İspanak	Yaprak leke hastalığı ( <i>Heterosporium variable</i> )	100 ml/da	3 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

07 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Devamı Arka Sayfada

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL AZİBUT

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C3:11	G1:3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Genel ilkyardım müdahaleleri:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

**Solunması halinde:** Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

**Deriyle temas etmesi halinde:** Cildi bol su ile yıkayın.

**Gözle temas etmesi halinde:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

**Yutulması halinde:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Azoxystrobin, Difenconazole

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak muhafaza ediniz, başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kalan ürün mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU  
Yüksek Kıymetli  
TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:****Domates (sera) - Patlıcangillerde Külleme:**

Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

**Bağ mildiyösü:**

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar

1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

**Bağ küllemesi:**

1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

**Bağda ölükol:****• Yaz uygulaması:**

1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

**Antepfıstığında Karazenk:**

1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir. Uygulamaların yapıldığı gün şiddetli yağış olmuştaysa uygulama tekrarlanmalıdır.

**Nar - Kahverengileke:**

1. uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2. uygulama: Taç yaprakları döküldüğünde yapılır.

3. uygulama: Meyveler yarı büyüklüğüne geldiğinde yapılır.

**Hıyar(sera) - Kabakgillerde Külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.

**İspanak yaprak leke hastalığı:** Uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve enfeksiyon riskinin yükseldiği dönemde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Diğer uygulamalara ise 10' ar gün ara ile 3 uygulama şeklinde yapılır.

**DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL AZİBUT** isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu **C3:11; G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL AZİBUT**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **C3:11; G1:3** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

**KARŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL AZİBUT**

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C3:11	G1:3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
------	-------	------	----------------------------

200 g/l Azoxytrobin + 125 g/l Difenoconazole

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirketidir.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgut ~~Özal~~ Mah. Turgutlu Cad. No:287 MANİSA


Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU  
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

07 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.