

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Bağ *	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	25 ml/100 L su	21 gün
Gül (Sera)	Gül Külleme (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	25 ml/100 L su	14 gün
Tütün	Tütün Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	35ml/100 L su veya 35 ml/da	14 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 L su	7 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 L su	7 gün
Çilek	Külleme (<i>Sphaerotheca macularis</i> f.sp. <i>fragariae</i>)	50 ml/100 L su	7 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi (*Erysiphe necator*):

- İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
- İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
- İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
- 4.ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PEKOZOL 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	G1: 3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-------	----------------------------

100 g/L Penconazole

- Önce etiketi okuyunuz. Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- Bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltmayınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma vb.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması Halinde: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutulması Halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınır.

Cilt Teması Halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

Göz Teması Halinde: Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa kontakt lensleri çıkarınız. Yıkama işlemi 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Yutulması Halinde: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı V.

Dr. Yunus BAYRAM

Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Penconazole, Ksilen, Emülgin 27, Emülgin 281

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H312:** Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarını ayol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H302+H312+H332:** Yutulduğunda ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
- H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

- P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.
- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
- P264:** Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ile iyice yıkayınız.
- P271:** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.
- P301+P312:** YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.
- P302+P352:** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
- P304+P340:** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.
- P363:** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.
- P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kalan bitki koruma ürünü mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KISIN

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

21 Kasım 2017

Gül Külleme (*Sphaerotheca pannosa*): Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tam yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrarlanır.

Tütün Külleme (*Erysiphe cichoracearum*): Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidermi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

Patlıcangillerde Külleme (*Leveillula taurica*): Uygulamalar tarlada ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kapayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Çilek Küllemesi (*Sphaerotheca macularis* f. *Sp.fragariae*):

1.Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.
2.ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara 10 gün ara ile devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL PEKOZOL 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL PEKOZOL 100 EC'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

EFDAL PEKOZOL 100 EC' nin etkinliği kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı yapılan bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak ürün ile fiziksel yönden karışma durumu bu ürüne az miktarda EFDAL PEKOZOL 100 EC ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PEKOZOL 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	G1: 3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-------	----------------------------

100 g/L Penconazole

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

M.Ş.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

21 Kasım 2017



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KIŞIN