

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:
Net Miktar :
Azami per. Satış fiyatı :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI ÖTLAR:

Bitki Adı:	Yabancı Ot Adı:	Kullanma Dozu ve Dönemi:
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i> , <i>C. approximate</i>)	300 g/da Yoncalar biçildikten sonra
Şeker Pancarı	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i> , <i>C. approximate</i>)	300-400 g/ da Küskütler çimlendikten sonra, pancara sarılmadan önce; Şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken

KULLANMA ŞEKLİ:

EFDAL PROKERP 50 WP, ıslanabilir toz formülasyonunda bir ilaçtır. EFDAL PROKERP 50 WP' den en iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda dekara 60-80 L su kullanılarak atılmaktadır.

Yoncada küsküt mücadelesinde EFDAL PROKERP 50 WP, iki ayrı zamanda uygulanabilir.

1. Geç kış ilaçlaması: Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz püskürtülen ilacın toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan ilaçlamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.

2. İlk hasattan hemen sonra: Ot hasadından hemen sonra yapılacak ilaçlama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur. Geç kış ilaçlamasında dekara 40 litre su, hasattan hemen sonra ise dekara en az 60 litre su atılması tavsiye edilir.

İlacın uygulamasını takip eden süreçte eğer yağmur yağışı yoksa ve/veya özellikle kurak geçen bir sezonun ardından kullanılacaksa, EFDAL PROKERP 50 WP' den iyi bir etki almak için ilacın kurumasının ardından toprağı hafif bir şekilde (5-10 mm) yağmurlama sulama ile ıslatınız.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki EFDAL PROKERP 50 WP'yi bir miktar kaptaki bir miktar su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içine yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL PROKERP 50 WP, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL PROKERP 50 WP' yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: Şeker pancarını takiben EFDAL PROKERP 50 WP uygulanmış alana münavebe bitkisi olarak kışkıl tahıllar ekilecekse toprağın en az 15 cm derinlikte sürülmesine dikkat ediniz.

KARIŞILABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlar ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PROKERP 50 WP

Islanabilir Toz (WP)
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

GRUBU	K1	HERBİSİT
-------	----	----------

Aktif Madde Miktarı: %50 Propyzamid
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide

- . ÖNCE ETİKETİ DİKKATLE OKUYUNUZ.
- . EVDE KULLANMAYINIZ.
- . ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDE UZAKTA KAPALI VE KİLİTLİ TUTUNUZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- . MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- . DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEZİNİZ, İÇMEZİNİZ VE SİGARA İÇMEZİNİZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- . İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Cilt ve gözde yanma ve tahrip yapabilir.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı hekim tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı ilağı yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkartın, doktora danışın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur.

Belirtilere göre tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 Sadece

Zehirlenme durumlarında arayınız.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İSTİFAKURUMU
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ahmet KAVAY
Genel Müdür Yardımcısı



(Zararlı)

Xn



(Çevre için tehlikeli)

N

İÇİNDEKİLER: Propyzamide içerir.

Uygulayıcı ve Çevre ile ilgili Risk ibareleri ve Açıklamaları:

R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibareleri ve Açıklamaları:

S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.

Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm.'den daha düşük basınçta çalıştırılmamalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

Balıkla zehirlidir, sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.

Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ilaç ambalajlarını yasalarda öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Normal (serin ve kuru) iyi havalandırılan ve güneş görmeyen yerlerde; açılmamış orijinal ambalajında ağız kapalı olarak saklanmalıdır. Normal depo şartlarında depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçı ilaçlarının kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

İMALATÇI FİRMA:

JIANGSU LUYE AGROCHEMICALS CO.,LTD.

Address:No.62, Kaifang Avenue, Yancheng, Jiangsu, China

İHRACATÇI FİRMA:

Shanghai Safe Chem International Trade Co., Ltd.Address: 11A, Zhong Cheng Building No.818 DongFang Road; Pudong New Area, Shanghai 200122 China.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

02 Ekim 2012

Sedef YÜCEL
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.