

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve no. su:

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Muz	Kök ur nematodları ( <i>Meloidogyne</i> spp.)	7,5 l/da	56 gün
	Spiral nematod ( <i>Helicotylenchus multicinctus</i> )	7,5 l/da	
Turunçgil Bahçelerinde	Turunçgil nematodu ( <i>Helicotylenchus semipenetrans</i> )	7,5 l/da	56 gün
Turunçgil Fidanlıklarında	Turunçgil nematodu ( <i>Helicotylenchus semipenetrans</i> )	5 l/da	---
Turunçgil Fidanları	Turunçgil nematodu ( <i>Helicotylenchus semipenetrans</i> )	200 ml/100 l su (bandırma)	---
Domates	Kök ur nematodları ( <i>Meloidogyne</i> spp.)	2,5 l/da	90 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Muz Bahçeleri:** Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

İlaçlamalar:

- Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
- İlk muz tarağının oluştuğu devrede
- Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır. Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Efdal Fenos 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

5 Şubat 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Umıt Uğur BAHÇE  
Daire Başkanı V.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL FENOS 400 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	1B	NEMATİSİT (Nematod İlacı)

400 g/l Fenamiphos

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- Bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kramp, karın ağrısı, göz bebeklerinin büzülmesi, nefes alma zorlukları, terlemedir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunum:** Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

**Yutma:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alın.

**Cilt teması:** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

**Göz teması:** Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa kontakt lensleri çıkarınız. Yıkama işlemini 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

**Ağız yoluyla alma:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

### İÇİNDEKİLER:

Fenamiphos ve Ksilen

### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar  
**H300+H310+H330:** Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.  
**H315:** Cilt tahrişine yol açar.  
**H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.  
**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ:

- P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.  
**P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.  
**P264:** Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ile iyice yıkayınız.  
**P271:** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız  
**P363:** Kirletmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.  
**P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.  
**P405:** Kilit altında saklayınız.  
**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.  
**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Damlama sulama sistemi ile tekrarlı uygulamalara gerek yoktur.
- Bu tür uygulamalardan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.
- Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.
- İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Burak KIŞIN

**Turunçgil Bahçeleri:** Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

**Turunçgil Fidanlıkları:** Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır.

**Turunçgil fidanları** nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya, 30 dakika süre ile bandırılır.

**Domates:** Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

EFDAL FENOS 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL FENOS 400 EC 'yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## **EFDAL FENOS 400 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	1B	NEMATİSİT (Nematod İlacı)

400 g/l Fenamiphos

#### **ANTİDOTU VE TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:**

Hastaya bol miktarda aktif kömür içeren bir bardak su içirilir. Doktor gözetiminde damardan 2 mg kadar ATROPİN SULFAT enjekte edilir.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



#### **DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### **FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### **RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Turgutlu yolu 9.km MANİSA  
Tel: 0 236 2340909 pbx. Çağrı Merkezi: 4443150  
Faks: 0 236 2379645  
[www.tarkimbk.com.tr](http://www.tarkimbk.com.tr)

5 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

Ümit Uğur BAHÇE  
Daire Başkanı V.

TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak KİŞİN