

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Otlar	Kullanma Dozu Ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
BUĞDAY	Yabani Yulaf (<i>Avena spp.</i>) Kuş otu (<i>Phalaris spp.</i>) Delice (<i>Lolium spp.</i>)	200 ml/da. Yabancı otların 2 yapraklı dönemi	14
PANCAR	Yabani Yulaf (<i>Avena spp.</i>) Kuş otu (<i>Phalaris spp.</i>) Delice (<i>Lolium spp.</i>)	200 ml/da. Yabancı otların 2 yapraklı dönemi	14
MERCİMEK-FASULYE	Yabani Yulaf (<i>Avena spp.</i>)	150 ml/da. Yabancı otların 2 yapraklı dönemi	14
SOĞAN	Yabani Yulaf (<i>Avena spp.</i>) Darı (<i>Setaria spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crusgalli</i>)	200 ml/da. Yabancı otların 2 yapraklı dönemi	14
GLAYÖL	Darıcan (<i>Echinochloa crusgalli</i>)	200 ml/da.	14

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam ederken depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYONU:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamalıdır.

10 Mart 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı-V

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL DORPEN 28 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

284 g/l Diclofop-Methyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 14 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, kusma, baş ağrısı, terleme, halsizlik.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Solunum: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alın.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz teması: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Yanlışlıkla yutulduğunda 200 ml Parafin yağı ve sonra 30 gr aktif kömür verilir. Hastayı kusturmaya uğraşmayınız. Adrenalin ve o gruptan olanları kesinlikle kullanmayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Diclofop-Methyl ve Ksilen

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI İŞARETİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302+H312+H332: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Tıkanmış memeleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Komşu kültür bitkilerinin bulaşmamasına dikkat ediniz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadelede işlerinde kullanmayınız.

TARIM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket vekili A.Ş.
Burak KIŞIN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

EFDAL DORPEN 28 EC, Yabancı otlara yaprakтан etki eden sistemik bir ilaçtır. Yabancı otların 2-4 yapraklı devrelerinde atıldığında, en iyi etki alınır. Sıcaklığın 30°C'nin üzerinde olduğu çok kurak havalarda atılmaz. Mısır, pamuk, çeltikte kullanılmaz. Motorlu sırt atomizörü haricinde her türlü aletle atılır. Etkisi hava şartlarına bağlı olup, ilaçlamadan 3-7 gün sonra belli olur. İlaçlamadan 2 saat sonra yağmur yağarsa, ilaçlamayı tekrarlamak gerekmez.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL DORPEN 28 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL DORPEN 28 EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EFDAL DORPEN 28 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

284 g/l Diclofop-Methyl

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.


FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx.
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

10 Mart 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KIŞIN

29 N