



tarkim

EFDAL KLORMET DC

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

GRUBU	G1,3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

150 g/l Prochloraz + 42 g/l Epoxiconazole

İÇİNDEKİLER:

Prochloraz, Epoxiconazole

ZARARLILIK İŞARETİ:**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE****ZARARLILIK İFADELERİ:****H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.**H302 + H312 + H332:** Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.**H360FD:** Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
H411: Suluc ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.**ÖNLEM İFADELERİ:****P201:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın**P308 + P313:** maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: tıbbi yardım / bakım alın.**P391:** döküntüleri toplayın.**P405:** kilit altında saklayın.**P501:** içeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere muhakkak uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Sedef YÜCEL YEKOĞLU
Yüksek Kurulu Başkan
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su: 31.01.2020 / 11568

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizmalar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa	Fide Yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp)	200 ml/da	56 gün
Buğday	Tahıl küllmesi (<i>Erysiphe graminis</i>)	200 ml/da	56 gün
	Tahıl fide yanıklığı, Kök, Kök boğazı çürüklüğü (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>rhizoctonia cerealis</i>)		
Çeltik	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	200 ml/da	56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Buğdayda tahıl küllmesi: Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda Fide Yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü hastalıkları: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır.

Arpada Fide Yanıklığı, Kök Ve Kök Boğazı Çürüklüğü hastalıkları: Hastalık ilk görüldüğünde yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır.

(EFDAL KLORMET DC buğday ve arpada en az 30 gün süreyle koruyuculuk sağlamaktadır. Uygulamadan 30 gün sonra hastalık koşulları devam ediyorsa ikinci bir uygulama yapılabilir.)

Çeltikte Çeltik Yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlaması olarak hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerektiğinde hava şartlarına bağlı olarak 30 gün sonra ikinci

uygulama yapılabilir.

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**Soluma:** Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız.

Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermezsiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermezsiniz.

Tıbbi bakım alınız.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.**Göz teması:** Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

Ağız yoluyla alma Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermezsiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
07 Ocak 2021TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
07 Ocak 2021

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel:0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr


tarkim
EFDAL KLORMET DC

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

GRUBU	G1,3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

150 g/l Prochloraz + 42 g/l Epxiconazole

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Sedef YÜCEL TEKOLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL KLORMET DC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL KLORMET DC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

07 Ocak 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

