

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve no. su:  
**KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:**

Bitki Adı	Yabancı Otlar	Kullanma dozu ve Dönemi
Buğday	Yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )	Dekara 30 ml dozda, tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

EFDAL CLOPAR 80 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin; buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. EFDAL CLOPAR 80 EC' den iyi sonuç; yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin, ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. EFDAL CLOPAR 80 EC' nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamaya müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

#### DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL CLOPAR 80 EC, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL CLOPAR 80 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
A ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

25 Nisan 2010

BS N

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

## EFDAL CLOPAR 80 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

80 g/l clodinafop-propargyl+ 20 g/l Cloquintocet mexyl (safener)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenmeden şüphe ediliyor ise derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız, ilaç ambalajını ve etiketini birlikte götürünüz.

**Cilt veya gözlerin ilaçla teması halinde:** Derhal bu kısımları bol su ile yıkayınız.

**Gözlere teması halinde:** Bulaşan ilacı bol temiz su ile asgari 10 dakika yıkayarak temizleyiniz. İlacın teneffüs edilmesi halinde temiz havaya çıkınız.

**Ağız yoluyla alınması durumunda:** Bol su ile tıbbi kömür veriniz. Konsantre ilacın ağız yoluyla çok miktarda alınması halinde ise tıbbi yardım istenir.

Not: Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez.

#### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 112

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketi



Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl ve Nafta

#### ZARARLILIK İŞARETİ:



#### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.

**H302+H312+H332:** Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

**H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

**P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.

**P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P314:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.

**P403 + P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Turgutlu yolu 9.km MANİSA  
Tel:0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645  
www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak Kişin