



**tarkim**  
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.

# Efdal Aplant

BUĞDAY - ARPA

Aktif Madde ve Miktarı **Pinoxaden 45g/l+ Cloquintocet-mexyl (safener) 20g/l**  
Grubu **A**

**HERBİSİT** (Yabancı Ot İlacı)  
Sistemik etkili

**Dar yapraklı  
Yabancı Otlarla  
Mücadelede  
Çözüm Ortağı**



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirketidir.

**444 31 50**  
Çağrı Merkezi  
[www.tarkimbk.com.tr](http://www.tarkimbk.com.tr)

# Efdal Aplant

## İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.


## ETKİ ŞEKLİ

- “Pinoxaden” : Lipid sentezini durdurur.
- Acetyl- Coa carboxylase enzimini (ACCCase) engeller.
- Uygulamadan 1-3 hafta sonra fitotoksik belirtiler ortaya çıkar.

## ÖZELLİKLERİ

- **Aplant** Emülsiyon Konsantr (EC) formülasyonludur.
- **Aplant** içeriğinde yayıcı yapıştırıcı olduğundan ek bir yayıcı-yapıştırıcı gerekmez.
- **Aplant** Tüm buğday çeşitleri ile yazlık ve kışlık arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden yeni aktif maddeli bir bitki koruma ürünüdür.
- **Aplant** Uygulamadan bir saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez.
- **Aplant** Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur.
- **Aplant** içerdiği yardımcı madde (Safener-Cloquintocet-mexyl) etkinliğini arttırmıştır.

## KULLANIM DÖNEMLERİ



- Buğday ve Arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir.

## UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

- Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır.
- Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
- Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.
- Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.
- Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
- İlaçlamalar yelpaze huzmeli meme tipi ile 20-40 lt/da ilaç normunda yapılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR	UYGULAM DOZU
BUĞDAY	Yabani yulaf ( <i>Avena fatua</i> )	90 ml/da (çıkış sonrası)
	Tilki kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	100 ml/da (çıkış sonrası)
	Yumuşak başaklı kuşyemi ( <i>Phalaris paradoxa</i> )	
	İngiliz çimi ( <i>Lolium perenne</i> )	
ARPA	Yabani yulaf ( <i>Avena fatua</i> )	90 ml/da (çıkış sonrası)

Yulafta kullanılmamalıdır.

Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneneğinden bu koşulların varlığı durumlarında uygulamadan kaçınılmalıdır.

## KARIŞILIRLIK DURUMU

- Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



İngiliz çimi (*Lolium perenne*)



Tilkikuyruğu (*Alopecurus myosuroides*)



Tilkikuyruğu (*Alopecurus myosuroides*)



Yabani yulaf (*Avena fatua*)



Yumuşak başaklı kuşyemi (*Phalaris paradoxa*)