



tarkim
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.

Efdal Labutro

PAMUK, BİBER, DOMATES

Aktif Madde ve Miktarı **Buprofezin 100 g/L + Lambda-cyhalothrin 20 g/L**
Grubu **3A-16**

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Kontakt ve mide zehiri etkilidir.

**Muhteşem
Çift Etkili
Sonuç**



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirkettir.



444 31 50
Çağrı Merkezi
www.tarkimbk.com.tr

Efdal Labutro

İLACI KULLANIRKEN

Kullanma dozu ve dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

ETKİ ŞEKLİ

- “Buprofezin” etken maddesi Beyazsinek larvalarının deri değiştirmelerini yavaşlatarak ölümlerine sebep olur. Ergin dişilerin yumurtalarının steril olmasına neden olur. Yumurtaların açılmasını ve dişilerin yumurta bırakmasını azaltır.
- “Lambda-cyhalothrin” zararlıların sinir sistemlerini bozarak etkili olur. Ani ve uzun süre etkilidir.
- Larvaların deri değiştirmelerinden sonra ölüm meydana gelir.



Sera Beyazsineği (*Trialeurodes vaporariorum*)

ÖZELLİKLERİ

- EFDAL LABUTRO beyazsineklerin larva ve erginlerinin kitin sentezi inhibitörüdür.
- EFDAL LABUTRO Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonludur.
- EFDAL LABUTRO Kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.
- EFDAL LABUTRO Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama aletiyle kullanılabilir.
- Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.



Tütün Beyazsineği (*Bemisia tabaci*)

KULLANIM ARALIĞI

- EFDAL LABUTRO ani ve uzun süreli koruma sağlar.
- Zararlıların popülasyon yoğunluğunun artışı dikkate alınarak gerek duyulduğunda 14 gün sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.



Tütün Beyazsineği (*Bemisia tabaci*)

KULLANIM ZAMANI

Biber, Biber (Sera), Domates - Beyazsineklerde bir dekarlık alanda en az 20 bitkinin alt, orta ve üst kısmından birer adet olmak üzere toplam 60 adet yaprakta sayım yapılır. Sayımda yaprak başına 5 adet larva+pupa tespit edildiğinde uygulamaya karar verilir.

Pamuk - Tütün Beyazsineğine karşı Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.



Tütün Beyazsineği (*Bemisia tabaci*)

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
BİBER	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	300 ml/da Larva, Ergin	7 Gün
BİBER (SERA)	Sera Beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)		
DOMATES	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	350 ml/da Larva, Ergin	—
PAMUK*	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)		

*Yeşil aksam uygulamalarında kullanılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

EFDAL LABUTRO Lambda-cyhalothrin gibi birçok insektisitlerle karışabilir. Karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ürünlerin ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.