



tarkim
TARKİM BİTKİ KORUMA A.Ş.

Efdal Kaspora

76 WG
KAYISI, ŞEFTALİ

Aktif Madde ve Miktarı **Ziram %76**
Grubu **M:3**

FUNGUSİT (Mantar ilacı)
Kontakt etkili.

Kaliteli
Ürün için
Efdal KASPORA'yı
seçin



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirkettir.



444 31 50
Çağrı Merkezi
www.tarkimbk.com.tr

ETKİ ŞEKLİ

- Temel olarak kontakt, **koruyucu** özellikte yaprak fungusitidir.
- Kontakt etkili olduğu için bitki içine ve meyve içine nüfuz etmez, bitki kökleri tarafından alınmaz.
- Yaprak yüzeyinde kaldığı için tedavi edici etkisi yoktur, hastalık başladıktan sonra etkili olmaz.

ÖZELLİKLERİ

- Suda dağılılabilen granül (WG) formülasyonu sayesinde suda maximum düzeyde erir ve ilaç hazırlanırken kesinlikle tozuzmaz.
- Lekesiz ve kaliteli ürün elde etmenizi sağlar.
- Ph'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

Kayısı Yaprak Delen:

1. **ilaçlama** sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
 2. **ilaçlama** ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu dönemi),
 3. **ilaçlama** meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.
- Şeftali Yaprak Kıvrıklığı (Glok):** Tomurcukların kabardığı dönemde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Yaprak Kıvrıklığı (*Taphrina deformans*)Yaprak Delen (*Wilsonomyces carpophilus*)

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. İlaçlama, günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkinin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Yaprak Kıvrıklığı (*Taphrina deformans*)Yaprak Delen (*Wilsonomyces carpophilus*)

KARIŞILIRLIK DURUMU


Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül hazırlamayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Kayısı	Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	250 g/100 L su	56 Gün
Şeftali	Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	200 g/100 L su	7 Gün

Şeftali Fenolojik Dönem



Kayısı Fenolojik Dönem

