

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Fasulye	Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza spp.)	20 g / da Yeşil aksama	14 gün

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Tarla koşullarında dekara asgari 20 L su kullanılmalı, yeşil aksamin bol olduğu yerlerde kullanılacak su miktarı dekara asgari 50 L'ye çıkarılmalı, karışım ile bitkiler iyi bir şekilde ıslatılmalıdır. Seralarda, bitkilerin büyüklüğüne ve sıklığına göre karışım miktarı 50-150 L civarında olmalıdır. Bitki aksamını karışım ile iyice kaplayınız, ancak karışım damlalarının birleşerek bitkiden yıkanarak uzaklaşmamasına özen gösteriniz. Karışımı uygularken bitkilerin dışına gelmemesine dikkat ediniz. Uygulanan alanın üzerinden bir daha geçmekten veya tavsiye edilen dozdan daha fazla uygulanmasından kaçınınız.

Fasulye-Yaprak Galerisinekleri: Yaprak başına ortalama 4 larva gözleendiğinde uygulamaya başlanır, gerektiği takdirde 30 gün aralıklarla tekrarlanır. Efdal Gubfos ile üçten fazla uygulama yapılmamalıdır.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında Efdal Gubfos mahsul tarafından çok iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas çeşit, yeni çeşit vs) bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.


tarkim
EFDAL GUBFOS

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	17	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

%75 Cyromazine

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buharını ve zerrecelerini solumayınız.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ciltte kızarıklık ve kabarıklık oluşturabilir. Göze temasında geçici kızarıklık yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunum Sonrası: Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutma Sonrası: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt Teması Sonrası: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz Teması Sonrası: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Cyromazine

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Deri tahrişine neden olur.
H319: Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+ P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ve su ile yıkayın.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka herhangi bir amaç ile tekrar kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.


TARIM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN

24 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. Mustafa İbrahim
Genel Müdür Yardımcısı V.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL GUBFOS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 17 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL GUBFOS' un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 17 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Nötr reaksiyonlu bazı insektisit ve fungusit ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde fiziksel karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim
EFDAL GUBFOS
ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP	17	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
		%75 Cyromazine

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

24 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN