

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma dozu	Son ilaçlama ile hasat arası süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	20ml/100 L su	28 gün
	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)		
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)		
Bağ*	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su	56 gün
Patlıcan Fasulye Hıyar	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	30 ml /100 L su	3 gün
Şeftali	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/ 100 L su	21 gün
Pamuk	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/da	---
Soya	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 ml/da	---

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL DİCO 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	10A	AKARİSİT (Kırmızı Böcek İlacı)
-------	-----	-----------------------------------

500 g/l Clofentezine

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanınız. Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- İlaçlanmış sahaya insan ve hayvan girmesinde sakınca yoktur.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belli bir semptomu yoktur. Muhtemelen halsizlik görülür. Yüksek miktarda alındığı takdirde göz ve deride yanmalara sebebiyet verir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız. Bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunma: Solunması halinde, kazazede açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutma: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen Özel bir antidotu yoktur, hastaya semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

26 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN

Net Miktarı:
Azami Per. Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Clofentezine

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ:

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H400: Sudaki yaşam için çok zehirlidir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimiyi arayın.

P363: Kirletmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- Boş ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma- Kırmızıörümcek ve akarlar: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Mücadelede popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 5-8 adet hareketli bireyi geçtiğinde

Hıyar, Patlıcan, Fasulye- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Patlıcan ve hıyarda yaprak başına ortalama 5 adet, fasulye için 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda yaprak başına ortalama 3-5 adet üzerinde kırmızıörümcek bulunması durumunda uygulama yapılmalıdır.

Pamuk- Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Soya- Kırmızıörümcekler: Baklalar olgunlaştıktan sonra uygulama yapılmamalıdır. Bir yapraklıkta ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege Bölgesi'nde 10 adet kırmızıörümcek bulunduğu kaplama uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL DİCO 500 SC, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 10A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL DİCO 500 SC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

EFDAL DİCO 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	10A	AKARİSİT (Kırmızı Böcek İlacı)
-------	-----	-----------------------------------

500 g/l Clofentezine

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Handwritten signature and initials.



26 Nisan 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KİŞİN