

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 02.07.2021 / 11963

| Bitki adı      | Zararlı organizma adı                                  | Uygulama dozu     | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|----------------|--|-------------------|--|
| Domates (Sera) | Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> ) | 125 ml / 100 l su | 3 gün                                  |
| Biber (Sera)   | Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> ) | 125 ml / 100 l su | 3 gün                                  |
| Hıyar (Sera)   | Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )              | 100 ml / 100 l su | 3 gün                                  |

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:


**Domates (sera), Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme:** Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Bir sezonda azami 3 uygulama yapılmalıdır.

**Hıyar (sera) Kabakgillerde Külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanılır. Hastalığın şiddeti, iklim koşullarına ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilir. Bir sezonda azami 3 uygulama yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** EFDAL KAMP 320 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL KAMP 320 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda İse, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1 :3 / C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

02 Temmuz 2021  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL KAMP 320 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| Grup | G1:3 | C3:11 | Fungisit (Mantar İlacı) |
|------|------|-------|-------------------------|
|------|------|-------|-------------------------|

200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunması halinde:** Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

**Yutulması halinde:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

**Cilt ile teması halinde:** Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız

**Göz ile teması halinde:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Tebuconazole, Azoxystrobin

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

**H332:** Solunması halinde zararlıdır.

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P102:** Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

**P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**P308 + P313:** Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

**P391:** Döküntüleri toplayın.

**P501:** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

**DEPOLAMA DURUMU:** Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tırgut Özal Mahallesi Tırgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Çiğri Merkez:4443150

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimb.com.tr

Sedef YÜCEL TEKOĞLU  
Yüksek Kimyager  
TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.