

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su: 11.04.2019/11357

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

| Bitki Adı | Kontrol ettiği yabancı otlar | Kullanma dozu | Son uygulama ile Hasat arası Süre |
|--------------|---|--|-----------------------------------|
| PAMUK | Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) | 100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir. | 56 gün |
| SOĞAN | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 50 ml /da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde | 28 gün |
| | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde | 28 gün |
| BAĞ* | Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) | 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde | 28 gün |
| | Köpekdişi ayırığı (Cynodon dactylon) | 150 ml/da çiçeklenme öncesi devrede | 28 gün |
| MERCİMEK | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken | 56 gün |
| | Yabani yulaf (Avena fatua) | 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken | 56 gün |
| | Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare) | 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken | 56 gün |
| | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken | 56 gün |
| ŞEKERPANCARI | Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) | 100 ml/da Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken. | 56 gün |
| | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 50 ml /da kardeşlenme döneminde iken | 56 gün |
| DOMATES | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boyda iken | 28 gün |
| PATATES | Kanyaş-Geliç (Sorghum halepense) | 100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm boyda iken | 28 gün |
| | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da Darıcanlar 8-10 cm boyda iken | 28 gün |
| KANOLA | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 50 ml/da buğday 2-4 yapraklı,3-5 cm boyda iken | 28 gün |
| | İtalyan çimi (Lolium multiflorum) | 100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı,3-5 cm boyda iken | 28 gün |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL ROUTER 150 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|-------|----|--------------------------------|
| GRUBU | A1 | HERBİSİT (YABANCI OT İLACI) |
|-------|----|--------------------------------|

150 gr/lt Fluazifop-P-Butyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

Yutma halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

Cilt teması halinde: Cildinizi su/duş ile durulayın. Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Göz teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Derhal bir doktor çağırın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Fluazifop-P-Butyl, Ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

H312+H332: Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Göz koruyucu, koruyucu eldivenler, solunum koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kapı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajları başka bir gaye için kullanılmamalıdır.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KIŞIN

11 Nisan 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR AKIÇAN
Daire Başkanı V.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Efdal Router 150 EC Geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, seçici bir yabancı ot ilacıdır. Son uygulama ve hasat arasındaki süre göz önünde bulundurmak kaydı ile EFDAL ROUTER 150 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde emniyetle kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları ve uygulama öncesi kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizonlarının parçalanmış olması, uygulamadan daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Uygulama iyi kaplama yapılması için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Uygulama için uygun basınç 3 atmosfer ve en uygun meme tipi yelpaze memelidir. Her türlü uygulama aletiyle uygulanabilir. Yer aletleriyle 20-40 litre su kullanılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

EFDAL ROUTER 150 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ROUTER 150 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL ROUTER 150 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

| | | |
|-------|----|--------------------------------|
| GRUBU | A1 | HERBİSİT (YABANCI OT İLACI) |
|-------|----|--------------------------------|

150 gr/lt Fluazifop-P-Butyl

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645

Çağrı Merkez: 4443150

www.tarkimbk.com.tr

11 Nisan 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KİŞİN