

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanım Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Elma	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	30 g/100 l su	7 gün
	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	37.5 g/100 l su	
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopylla pyri</i>)	100 g/100 l su	7 gün
Fasulye	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	75 g/100 l su	7 gün
Pamuk	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/da	7 gün
Bağ*	İki noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 g/100 l su	7 gün
Çilek	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Gül	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Karanfil	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	60 g/100 l su	7 gün
Domates	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	75g/ da	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışımı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda transpirasyon özelliğe sahip bir akarisitir. Kırmızıörümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder.

Elma-Avrupa kırmızıörümceği ve Akdiken akarı Mayıs ayı başından itibaren 100 yapraklı periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-15 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticareti



EFDAL TEBUSAI 20 WP

Suda Islanabilen Toz (WP)

GRUBU	21-A	İNSEKTİSİT VE AKARİSİT (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	------	--

%20 Tebufenpyrad

- Önce etiketi okuyunuz,
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alın ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alın.

Cilt teması: Cildi hemen en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Ürünün bulaştığı giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Tebufenpyrad

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:
H302: Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P201:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P264:** Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.
- P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P301 + P312:** YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P330:** Ağızınızı çalkalayın.
- P501:** İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KIŞIN



Armut-Armu psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemc amamının açılıp 2. ve 3. dönem nimflerin görölmeye başlandıđı ve sürgünlerin %15' ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Fasulye – pamuk kırmızıörümceđi: Fasulyede yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bađ-İki noktalı kırmızıörümcek: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Çilek – Pamuk kırmızıörümceđi:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduđu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görölmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadıđı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görölür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Populasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yapraklık incelenir. Yapraklık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Pamuk-Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı iken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi' nde 5 adet, Ege ve Güneydođu Anadolu Bölgesi' nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates-Kırmızıörümcekler: Domateste yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Göl ve Karanfil-Kırmızıörümcekler: Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandıđında tamamı ilaçlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL TEBUSAI 20 WP isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 21-A olarak sınıflandırılmış bir insektisit ve akarisit. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL TEBUSAI 20 WP' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiđi durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL TEBUSAI 20 WP

Suda Islanabilen Toz (WP)

GRUBU	21-A	İNSEKTİSİT VE AKARİSİT (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	------	--

%20 Tebufenpyrad

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Çađrı Merkezi:
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

Handwritten signature



27 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĐÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KIŞIN