

Mısır • Baę • Biber (Sera) • Domates (Sera)

Aktif Madde ve Miktarı **Indoxacarb %30**
Grubu **22A**

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Mide Zehiri ve Kontak etkili

**Kelebek
Larvalarına Karşı**
**güvenli
çözüm**



KULLANILAN BİTKİ ve ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Mısır	Çizgili Yaprakkurdu (<i>Spodoptera exiqua</i>)	12,5 g/da	3 Gün
Bağ*	Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	12,5 g / 100 L su Larva	10 Gün (sofralık ve şaraplık üzüm)
Biber (sera)	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	17 g / 100 L su Larva	3 Gün
Domates (sera)	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	17 g / 100 L su	3 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



Salkım Güvesi (*Lobesia botrana*)



Pamuk Yaprakkurdu (*Spodoptera littoralis*)



Çizgili Yaprakkurdu (*Spodoptera exiqua*)

ETKİ ŞEKLİ

indox mide ve temas yolu ile etkili bir insektisittir.
indox böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder.

ÖZELLİKLERİ

indox mısır, bağ, biber ve domateste zararlılarla mücadelede kullanılan bir ilaçtır.
indox Suda Dağılılabılır Granül formülasyonlu bir ilaçtır.
indox Zararlı larvalarının her döneminde etkilidir.
İlaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlıların beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. 24 ile 60 saat içinde de zararlılar ölür.
indox ilaçlamadan sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağın yağışlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

ÇEVRE DUYARLILIĞI

Bal arılarına, tozlayıcı arılara (bombus arıları) ve kuşlara zehirli değildir. Ancak bal arıları ve tozlayıcı arıların (bombus arıları) aktif olmadığı zaman uygulanmalıdır. (örneğin sabah erken ya da akşam saatlerinde uygulayın.)
Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanıldığı yerlerde kovanların **indox** uygulamasında önce kapatılması ve ilaçlama sonrasında 72 saat boyunca kapalı tutulması önerilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlar ile karıştırmadan önce bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Entegre Mücadele Programlarında (IPM)
kullanılabilmektedir.



UYGULAMA ZAMANI

Bağ Salkım Güvesi: En iyi etki için ilaçlama zararlıların yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan ilaçlama ile henüz açılmamış yumurtalarla, yeni bırakılacak yumurtalara karşı da kontrol sağlanır. Zararlı yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.
Mısır Çizgili Yaprak Kurdu: Yapılan tarla kontrolünde bir bitkiye ortalama 2 larva düşüyorsa hemen ilaçlama yapılır.
Biber ve Domates Pamuk Yaprak kurdu: En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Sebze alanlarının köşegenleri yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir. Zararlıların dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. EFDAL INDOX 30 WG zararlıların larvalarına etkilidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Bağ da: Sezon içinde sofralık üzümlerde 6, Şaraplık üzümlerde ise 3 uygulamaya kadar ilaçlama tekrarlanabilir.
Mısır da; Sezon içinde aynı yerde 3'ten fazla **indox** uygulaması yapmayınız.
Biber ve Domates de: Sezon içinde aynı yerde 4'ten fazla **indox** uygulaması yapmayınız.