

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. Su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
AYÇİÇEĞİ	Ayçiçeği mildiyösu (<i>Plasmopora helianthi</i>)	500 ml/100 kg tohum	---
HIYAR (Tarla)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250 ml/ da	3 gün
PATATES	Patates mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 ml/ da	3 gün
TÜTÜN (Fidelik)	Tütün fidelerinde çökerten/ (<i>Pythium spp.</i>)	7,5 ml/m ² (3-4 L su ile)	3 gün
DOMATES (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora</i>)	250 ml/100 L su	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlayacak şekilde uygulama yapılır. Bitki koruma ürünü uygulanmış bir tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce karışımı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmınız.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25 Aralık 2017

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PROCAR 722 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	F 4:28	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	--------	-------------------------

722 g/L Propamocarb-HCl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaçlamadan sonra insan ve hayvan girmesinde sakınca yoktur.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması ve ateş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Cilt ile temas halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile temas halinde: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Bitki koruma ürünü kolinesterası önleyecek kadar çok yutulmuş ise antidot olarak Atropinsülfat kullanılır. Bitki koruma ürünü az alınmış ise semptomatik tedavi uygulanması yeterlidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

Net Miktarı
Azami per. Satış fiyatı
İÇİNDEKİLER: Propamocarb-HCl



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında, kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KIŞIN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Ayçiçeği mildiyösü:

Uygulama ekimden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır. Sıvı bir bitki koruma ürünü olup gerek toz gerekse sıvı formülasyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen karışım miktarı 1-1,5 L su içerisinde çözündürülür ve sonrasında su bütün tohuma homojen olarak dağıtılır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar):

Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlar ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafına, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Patates mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Domates mildiyö: Kimyasal mücadeleye için çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Tütün fideliklerinde çökerten: Tütün fideliklerinde tohum atıldıktan hemen sonra toprak hafif nemlendirilir. Sonra bitki koruma ürünü uygulaması yapılır. 25-30 gün sonra uygulama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL PROCAR 722 SL, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grubu F 4:28** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL PROCAR 722 SL'** yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup F 4:28 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

EDAL PROCAR 722 SL, diğer fungusitlerle tank karışımı halinde kullanılabilir. Bordo bulamacı ve yaprak gübresi ile karışmaz. Tohum uygulaması olarak kullanıldığında hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL PROCAR 722 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	F 4:28	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	--------	----------------------------

722 g/L Propamocarb-HCl

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım
Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
25 Aralık 2017

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili
Burak KİŞİN