

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve no. su:

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
AYÇİÇEĞİ (ÇIKIŞ ÖNCESİ)	Yabani hardal ( <i>Sinapsis arvensis</i> ) Sirken-İştir ( <i>Chenopodium album</i> ) Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> ) Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Yavşanotu ( <i>Veronica spp.</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da  Darıcan otuna:300 ml/da  (Ayçiçeği ekiminden sonra, çıkış öncesi olarak)	-
	AYÇİÇEĞİ (ÇIKIŞ SONRASI)	Yabani hardal ( <i>Sinapsis arvensis</i> ) Sirken-İştir ( <i>Chenopodium album</i> )	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 yaprak döneminde
HAVUÇ	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken-İştir ( <i>Chenopodium album</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapsis arvensis</i> ) Eşek marulu ( <i>Sonchus arvensis</i> ) Yabani semizotu ( <i>Portulaca oleraceae</i> ) Yeşil kirpi darı ( <i>Setaria viridis</i> )	150 ml/da Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
	NOHUT	Yabani hardal ( <i>Sinapsis arvensis</i> ) Sarmaşık çobandeğneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) Dilkanatan ( <i>Galium aparine</i> ) Küçük turp ( <i>Rapistrum rugosum</i> ) Sirken-İştir ( <i>Chenopodium album</i> )	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde
	Dikenli yabancı marul ( <i>Lactuca serriola</i> )	75 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	
MERCİMEK (ÇIKIŞ ÖNCESİ)	Yabani hardal ( <i>Sinapsis arvensis</i> )	250 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
	Gönül hardalı ( <i>Myagrum perfoliatum</i> )	300 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	
MERCİMEK (ÇIKIŞ SONRASI)	Yabani hardal ( <i>Sinapsis arvensis</i> )	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün
	Gönül hardalı ( <i>Myagrum perfoliatum</i> ) Sarmaşık çobandeğneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



## EFDAL ZAFFAR 600

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	F3	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

600gr/L Aclonifen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Reflekslerde yavaşlama, idrarda sarı renk.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Soluma:** Solunduğu takdirde temiz havaya çıkartınız. Soluma, yutma ya da temas halinde tıbbi yardım alınız ve mümkünse yanınızda ilacın etiketini ya da güvenlik bilgi formunu bulundurunuz.

**Yutma:** Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

**Cilt teması:** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

**Göz teması:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

Net Miktarı:  
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:  
Aclonifen

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT  
ZARARLILIK İFADELERİ:

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

**P273:** Çevreye yayılmasını önleyiniz.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P308+P313:** Maruz kalma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

**P391:** Döküntüleri toplayın.

**P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak bulundurunuz.
- İlaçlamadan sonra alet ve makineleri bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

17 Ocak 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Vekili  
Burak Kişin

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

Kullanmadan önce ilaç ambalajını kuvvetlice çalkalatin. İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su koyun. Karıştırıcı çalışır durumda iken gerekli miktar ilacı ilave edin ve tekrar su doldurun. Çıkış öncesi ilaçlamalarda toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Bunun için toprak iyi işlenmiş, keseksiz olmalıdır. Çıkış sonrası ilaçlamalarda kültür bitkisinde kısa süreli ve geçici hafif sararma görülebilir.

**NOT:** EFDAL ZAFFAR 600 ilacı yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçın, Sarı-98, Menemen 92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güney Doğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

**DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:**

EFDAL ZAFFAR 600 isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu F3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ZAFFAR 600' ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  
**tarkim**  
**EFDAL ZAFFAR 600**

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	F3	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

600gr/L Aclonifen

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Bilinen antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanmalı ve belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

17 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



TARKİM BİTKİ KORUMA  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Şirket Vekili  
Burak KİŞİN