



EFDAL KİMTOKS®

MOLLUSSİT

(Salyangoz ve Sümüklüböcek ilacı)
Toz Yem

Etkin Madde Miktarı: %5 Metaldehyde
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
LD₅₀ = 283mg/kg

DİKKAT

- . ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
- . EVDE KULLANMAYINIZ
- . ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
- . İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİZ
- . MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ
- . İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ
- . İLAÇLANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Kusma, karın ağrısı, bacaklarda hissizlik, uyuşukluk, adale sertlikleri, kramplar, yüzün kızarması, vücut ısısının yükselmesi.

İLK YARDIM ŞEKLİ: Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırın, ilaçla bulaşan vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Şayet ilaç ya da ilaç ağızdan alındıysa hastayı kusturunuz. Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Teneffüs depresyonları uygun stimulanlar muhtemel karaciğer zararları ise GLUKOZSALİNE, KALSİYUM GLUKONAT İNTRAVENOUS olarak vermekle önenebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 (Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız)



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Azami per. Satış fiyatı :

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) depo şartlarında depolandığında 2 yıl süre ile fiziki, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km

MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlının Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Sebzelerde, Fidanlarda, Meyve ve Orman ağaçlarında, Tütün ve Süs bitkilerinde	Salyangoz (<i>Helix spp.</i> , <i>Helicella variegata</i>)	4-5 Kg/da Zararlı görülürken
	Sümüklü Böcekler (<i>Arion spp.</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agridimax agretis</i>)	4-5 Kg/da Zararlı görülürken

KULLANILDIĞI YERLER:

Seralarda ve dış bahçelerdeki bitkilere arız olan salyangoz ve sümüklü böceklerin imhasında müessir bir şekilde kullanılır. Preparat, mezkür zararlılara kontak ve mide zehiri olarak tesir eder, onları imha eder. Tatbikatı, tercihen yağmurdan sonra sıcak ve rutubetli havalarda bitkilerin arasına serpilerek veya 8-10 cm yüksekliğinde kümeler halinde yerleştirmek süratiyle yapılır. Bu kümeler akşamdan hafifçe ıslatılır. Miktar, umumiyetle beher dönüme takriben 4-5 Kg. ilaç olarak hesaplanır.



Dr. Anıtepe AFSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

05 Mart 2010

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.