

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 26.06.2003 / 4403

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	
KİMYON	Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>)	200 ml/da Kültür bitkisi: 3-4 çatal döneminde Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>)		
	Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)		
	Muhabbet çiçeği (<i>Reseda lutea</i>)		
	Soda otu (<i>Salsola ruthenica</i>)		
	Yapışkan nakil (<i>Silene conoidea</i>)		
	Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>)		
Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>)			
SOĞAN (ARPACIK)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	150 ml/da Kültür bitkisi: 2-4 yapraklı dönemde Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde	
	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)		
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)		
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)		
	Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>)		
	Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)			
Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)			
Pıtrak (<i>Xanthium spinosum</i>)			
ANASON	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	175 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra Yabancı otlar: Çıkış öncesi	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		150 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış sonrası Yabancı otlar: Çıkış öncesi
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)			
Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)			
Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)			
HAVUÇ	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	175 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra Yabancı otlar: Çıkış öncesi	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
NOHUT	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	150 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış sonrası Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
NOHUT	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>)	200 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış öncesi Yabancı otlar: Ekimden sonra	
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)		



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL LİNOS

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C2,7	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	--------------------------------

450 g/L Linuron

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, halsizlik vb.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması Halinde: Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

Yutulması Halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

Cilt ile Teması Halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Göz ile Teması Halinde: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



03 Aralık 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Linuron

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H373: Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Komşu kültür bitkisine bulaşmamasına dikkat ediniz.
- Tıkanmış adaptörleri ağızımızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Uygulamada kullanılan ekipmanları diğer mücadele işlerinde kullanmadan önce sabunlu ve sodalı su ile iyice yıkayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çıkış öncesi uygulama: Ekim'den sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. Uygulama sırasında toprak tezek siz olmalıdır. Uygulamanın yapıldığı alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda uygulama daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ürünü kullanırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisine zararlı olmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL LİNOS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu C2,7 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL LİNOS'** u aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2,7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.


tarkim
EFDAL LİNOS

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C2,7	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------	--------------------------------

450 g/L Linuron

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Yutulması halinde, mide 4 litre su ile yıkanır. Sonra tıbbi kömür ve SODIUM SULPHATE verilir. TOLONIUM CHLORİDE (TOLUIDİN BLUE) 300 mg i.v. veya METHYLEN BLUE (%1 solüsyon) 1-2 mg vücut ağırlığı verilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgutlu yolu 9.km MANİSA
Tel:0 236 2340909
Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



03 Aralık 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.