

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arasında ki Süre
Pamuk	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	
	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/da (Yumurta, larva, nimf)	
Patlıcan	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	1 gün
Elma	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Bağ *	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 Gün
Hıyar (Sera)	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100ml/100 l su (yumurta, larva, nimf)	3 Gün
Biber (Sera)	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100ml/100 l su (yumurta, larva, nimf)	3 Gün
Domates (Sera)	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	100ml/100 l su (yumurta, larva, nimf)	3 Gün
Karpuz	İki noktali kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	125ml/da (yumurta, larva, nimf)	3 Gün

(* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışimli su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL HEKZARUN 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	10: A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
------	-------	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel Zehirlenme Belirtileri Görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınır.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etkilenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

Göz teması: Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa kontakt lensleri çıkarınız. Yıkama işlemi 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Hexythiazox ve Ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar
H312+H332: Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Faydalı böcekleri etkilemez.
- Temas ve mide yolu ile etkilidir.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz. İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını, atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması ve hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

05 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KİŞİN



Handwritten signature and initials.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta kırmızıörümcek; Mücadele zamanı belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı organizma yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda kırmızıörümcek; Yapılan sayımlarda 5 – 8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Elmada kırmızıörümcek; Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8 – 10 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.

Hıyar, patlıcan ve karpuzda Kırmızıörümcek; Rastgele seçilen bitkilerde, bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğu anda ilaçlama yapılır.

Biber ve domateste kırmızıörümcek; Rastgele seçilen bitkilerde, bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 20 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 3 canlı birey bulunduğu anda ilaçlama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL HEKZARUN 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10: A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL HEKZARUN 50 EC'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL HEKZARUN 50 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	10: A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)
------	-------	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şirkettir.



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx. Çağrı Merkezi: 4443150

Faks: 0 236 2379645 www.tarkimbk.com.tr

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05 Ağustos 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Handwritten signature)
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şirket Vekili
Burak KİŞİN