

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su:
Net Miktarı :
Azami per. Satış fiyatı :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMA ADI:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma dozu	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)
Şekerpancarı	Toprakaltı Zararlıları (<i>Agriotes spp.</i> , <i>Collembola spp.</i> , <i>Cleonus spp.</i> , <i>Lixus spp.</i>)	750 gr/100 kg tohuma
	Toprak pire böcekleri (<i>Chaetocnema spp.</i>)	750 gr/100 kg tohuma
Buğday	Ekin Kambur Böceği (<i>Zabrus spp.</i>)	200 gr/100 kg tohuma. Larva - Ergin
Mısır	Tel kurtları (<i>Agriotes spp.</i>)	500 gr/100 kg tohum, larva
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	15 gr/100 kg tohuma, larva-ergin
	Tel kurtları (<i>Agriotes spp.</i>)	30 gr/100 kg tohuma, larva

KULLANIM ŞEKLİ:

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Şekerpancarı: Şekerpancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi; ekipman tipine, karışıma giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir. 100 kg tohum için gerekli miktar ilaç 15-20 lt suya ilave edilerek dibe çökmesi beklenir sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçı eriyik 3 defada tohuma uygulanır, her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön denem ile ideal su miktarı bulunur (bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir). Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içersine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

3-05-2013

Dr. Nerzat BİRİŞK
Genel Müdür Tarım Bakanlığı

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL İMİDRİD 70 WS

Suda Disperse Olan Toz (WS)

Aktif Madde Miktarı: %70 imidacloprid

1-(6-chloro-3- pyridin-3 ylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenamine)

GRUBU	4A	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

- . KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- . EVDE KULLANMAYINIZ.
- . ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- . MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ
- . DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ TOHURLARI GIDA VE YEM OLARAK KULLANMAYINIZ.
- . İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hissizlik durumu, nefes almada güçlük, titreme, kaslarda kramp.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırınız. Hastanın bilinci yerinde değilse, sabit bir şekilde yan yatırınız.

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. Solunması halinde hastayı temiz havaya çıkartınız ve dinlenme pozisyonunda tutunuz. Derhal doktora başvurunuz. Deriye teması halinde suyla iyice yıkayınız. Tıbbi yardım isteyiniz. Göze teması halinde suyla iyice yıkayınız. Bir göz doktoruna başvurunuz. Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, ağız su ile çalkalayınız. Doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini beraberinizde götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. semptomatik tedavi uygulanır.

ÜLUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 Sadece Zehirlenme durumlarında arayınız.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



Tehlike özelliği ve Tehlike Sembolü:

Xn: Zararlı  N: Çevre için tehlikeli 

İÇİNDEKİLER: İmidacloprid içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S22 Tozlarını solumayın.
S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye saliverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Suda yaşayan canlılara zararlıdır. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: İlaç imal tarihinden itibaren, ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, normal şartlarda serin, kuru, rutubetsiz ve sıcaklığı 35°C' yi geçmediği şartlarda depolandığında, fiziki, kimyasal ve biyolojik özelliklerini hoşgörür (tolerans) sınırları dışında 2 yıl süre ile muhafaza eder.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla firmamız ilacın kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın uygun olmayan koşullarda depolanması veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mısır: 100 kg tohum için önerilen ilaç 1,5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemin üzerine yayılmış naylon üzerindeki tohumu ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem ilaçlama varil (kaskat) ve ilaçlama bidonları içinde geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerle havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubetten dolayı sürme gücü düşer.


Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır. Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defa püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının, tohumluğu ıslatacak; fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvalanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenilebilir. İlaçlama, çuvalama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL İMİDRİD 70 WS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL İMİDRİD 70 WS 'yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik Durumu: Thiram ve Hymexazol aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL İMİDRİD 70 WS

Suda Disperse Olan Toz (WS)

Aktif Madde Miktarı: %70 imidacloprid

1-(6-chloro-3- pyridin-3 ylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenamine)

GRUBU	4A	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	-----------------------------

- . KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- . EVDE KULLANMAYINIZ.
- . ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- . MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ
- . DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ.
- . BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ TOHURLARI GIDA VE YEM OLARAK KULLANMAYINIZ.
- . İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



İMALATÇI FİRMA:

JIAANGSU PESTICIDE RESEARCH INSTITUTE
CO.,LTD.

No.90-80 FangShui Road, Nanjing Chemical Industry Park,
Luhe District, Nanjing, Jiangsu China

Tel: +86-025-89638015

Fax: 86-025-89638015

İHRACATÇI FİRMA:

Shanghai Safe Chem International Trade Co., Ltd.
Address: 10F, No.818 DongFang
Road, Shanghai China

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Turgutlu yolu 9.km

MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kimyager